

RADIFORT



Concime organico azotato carniccio fluido in sospensione

Composizione

Azoto (N) organico: 3%, Azoto (N) organico solubile in acqua: 3%

Carbonio (C) organico di origine biologica: 10%

Caratteristiche

Formulato atto a migliorare l'attecchimento delle piante arboree e erbacee nel substrato di coltura o terreno a cielo aperto.

L'uso del prodotto abbassa drasticamente la moria post-trapianto o piantumazione, facilitando l'emissione di una nuova radice sia primaria che secondaria.

Radifort ha la peculiare caratteristica di stimolare l'attecchimento e la formazione delle micorrize attraverso l'induzione biochimica di sostanze specifiche endogene, prodotte dalla pianta per promuovere il rapporto mutualistico con i funghi micorrizici.

Dosi e modalità d'impiego

PIANTA DA METTERE A DIMORA A RADICE NUDA CON PANE DI TERRA NELLE RADICI:

Sommergere la porzione radicale in una miscela di 1/3 di Radifort e 2/3 di acqua per un minuto circa. In alternativa, si può nebulizzare il prodotto tal quale sulle radici o sul panetto di terra.

PIANTE GIÀ A DIMORA :

Utilizzare Radifort in fertirrigazione in ragione di 15-30 kg per ettaro nelle piante arboree e 8-12 kg per quelle erbacee. In caso di grandi esemplari arborei si può fare un trattamento localizzato alle radici sottochioma, con palo iniettore o nutritore.

CONFEZIONI: TANICHE DA KG 5, KG 10 E KG 25.