



Concime CE

soluzione di concime a base di zinco

Composizione

Zinco (Zn) solubile in acqua chelato con EDTA: 2%

Agente chelante: EDTA.

Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata: 3-9

Caratteristiche

Concime fogliare idoneo a limitare i danni da eccessiva perdita d'acqua della lamina fogliare nei periodi siccitosi estivi, da condizioni estreme in serra, da vento, da colpi di calore.

Ottimo per garantire freschezza nelle pratiche di trapianto vivaistiche o prima delle piantumazioni.

E' indicato per ridurre le scottature solari sui frutti, l'avvizzimento e promuovere la normale distensione del carpo.

Si usa nelle colture orticole a pieno campo, specialmente quelle da taglio, per proteggerle anche dall'eccessiva pioggia e repentini danni da freddo.

Abbinato a antiparassitari ne riduce la fitotossicità e ne prolunga – per quelli di copertura – l'efficacia nel tempo.

Dosi e modalità d'impiego

PER VIA FOGLIARE: Trattare periodicamente ogni 8-15 giorni relativamente al tipo di coltura e di clima, con dosi di 400-600 grammi per q.le d'acqua che corrispondono sommariamente a: 5-7 kg/ettaro per le colture arboree e 2-4 kg/ettaro per le colture orticole o ornamentali erbacee.

Agitare prima dell'uso.

CONFEZIONI: TANICHE DA KG 5 E DA KG 10.